

Modelo estético, imagen corporal, autoestima y sintomatología de trastornos alimentarios en adolescentes mexicanas y españolas (pp. 273-283)

Lucero Munguia, Marisol Mora y Rosa M. Raich
Universidad Autónoma de Barcelona (España)

El objetivo del trabajo fue analizar la relación del país de origen, la insatisfacción con la imagen corporal, la interiorización del ideal estético y la autoestima en el desarrollo de sintomatología de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en adolescentes de México y España. Participaron 117 mujeres, 68 mexicanas y 49 españolas (*Medad*= 15,34; *DT*= 0,51), quienes contestaron el “Cuestionario para la evaluación de los trastornos de la conducta alimentaria” (EDE-Q), el “Cuestionario de imagen corporal” (BSQ), el “Cuestionario de influencias del modelo estético corporal” (CIMEC-26) y la “Escala de autoestima de Rosenberg” (RSES). En cuanto a la sintomatología de TCA, el conjunto de interacciones del país con el resto de variables no mostro influencia significativa ($p= 0,721$), la insatisfacción con la imagen corporal ($p< 0,005$) y la interiorización del ideal estético ($p= 0,002$) mostraron un efecto positivo significativo, mientras que la autoestima y el país un efecto estadísticamente nulo. Estos resultados muestran que no hay diferencias entre la influencia de los factores de riesgo y el desarrollo de sintomatología de TCA en ambos países.