

Autoeficacia de personas drogodependientes en tratamiento (pp. 325-343)
Francisca López-Torrecillas¹, Isabel C. Salazar², Rocío García-Retamero¹ y Rosario
Martínez Arias³

¹*Universidad de Granada;* ²*Centro de Psicología Clínica FUNVECA;* ³*Universidad
Complutense de Madrid (España)*

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la autoeficacia de consumidores de heroína y alcohol que están en tratamiento para su adicción, a partir de los modelos teóricos propuestos por Bandura y Annis. Participaron 162 pacientes ambulatorios, asignados a uno de los tres grupos de tratamiento: con metadona, libre de drogas y para el consumo de alcohol. Los sujetos fueron evaluados con la “Escala de autoeficacia” (Sherer et al., 1982), el “Cuestionario de confianza situacional” (IDTS; Annis y Martin, 1985) y la “Entrevista de investigación acerca del comportamiento adictivo” (EICA; López-Torrecillas, 1996). Los grupos con metadona y libre de drogas obtuvieron puntuaciones más altas en autoeficacia (general y total) que el grupo de alcohol y el grupo con metadona obtuvo puntuaciones más bajas en confianza situacional que el grupo libre de drogas y el grupo de alcohol, obteniendo este último las puntuaciones más altas. Los resultados parecen indicar que los modelos hacen referencia a aspectos diferentes de la autoeficacia. Serán necesarias más investigaciones para analizar la naturaleza de esta diferencia.