

**Correlatos y adherencia al tratamiento de maltratadores de pareja: agresores generalizados vs. sólo dentro de la familia** (pp. 549-569)

Arthur L. Cantos<sup>1,2</sup>, Daniel A. Goldstein<sup>2</sup>, Lauren Brenner<sup>2</sup>, K. Daniel O'Leary<sup>3</sup> y Robert Verborg<sup>4</sup>

<sup>1</sup>*Universidad Carlos Albizu (Puerto Rico)*; <sup>2</sup>*Universidad de Medicina y Ciencia Rosalind Franklin*; <sup>3</sup>*Universidad Stony Brook*; <sup>4</sup>*Circuit Court of Lake County (USA)*

Se examinaron los correlatos y nivel de adherencia al tratamiento de agresores masculinos de violencia contra su pareja, clasificados como generalmente agresivos (GV) y agresivos sólo dentro de la familia (FO), sentenciados a completar programas de intervención. Se examinaron los archivos de 456 hombres en libertad condicionada en Lake County, Illinois, entre los años 2006 y 2008, y fueron categorizados como FO ( $n=269$ ) o GV ( $n=187$ ). Los hombres GV eran más jóvenes, con historiales criminales más extensos, mayor consumo de sustancias y factores demográficos de mayor riesgo relacionados con la educación y el empleo. Mostraron menos probabilidad de completar un programa de intervención obligatorio y mayor riesgo de reincidir en comparación a los hombres FO, aun cuando se controlaron diferencias de raza. Se resalta la utilidad de un sistema de categorización dicotómico, fiable y de uso sencillo para que oficiales de libertad condicionada distingan entre hombres FO y GV con correlatos diferenciados y asociados a distintos niveles de adherencia al tratamiento. Se discuten las implicaciones para la intervención con agresores de su pareja íntima.