

Trastornos de la personalidad en adultos jóvenes dependientes del cannabis en tratamiento: un estudio comparativo (pp. 229-239)

Enrique Echeburúa¹, Ricardo Bravo de Medina² y Javier Aizpiri²

¹*Universidad del País Vasco;* ²*Medicina Psico-Orgánica, S.L. Bilbao (España)*

En este artículo se determina la tasa de comorbilidad de trastornos de la personalidad en adultos jóvenes dependientes del cannabis en tratamiento. La muestra consta de 141 pacientes diagnosticados de dependencia del cannabis en el grupo experimental, de 140 pacientes no adictos en el grupo clínico de control y de 140 sujetos, con las mismas características demográficas (edad, sexo y nivel socioeconómico), en el grupo normativo de control. Los instrumentos de evaluación para los trastornos de la personalidad son el MCMI-II y el IPDE y la entrevista con los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR. Sólo se considera trastorno de personalidad cuando un sujeto puntúa positivo en ambas pruebas y el trastorno es coincidente. Los resultados muestran que el 32,8% de los pacientes del grupo experimental presentan trastornos de la personalidad, frente al 23,7% del grupo clínico de control y el 10% del grupo normativo de control. Los trastornos de mayor prevalencia para el grupo experimental son el trastorno narcisista (11,3%), seguido del antisocial (9,9%) y el esquizotípico (9,9%). Se comentan las líneas futuras de investigación para este tema.