

Personalidad y sensibilidad a la ansiedad como factores de vulnerabilidad en el trastorno de pánico (pp. 185-201)

Jorge Osma^{1,2}, Azucena García-Palacios³, Cristina Botella³ y Juan Ramón Barrada¹

¹*Universidad de Zaragoza;* ²*Creos, Centro de Psicoterapia y Formación;*

³*Universidad Jaume I (España)*

Se estudiaron las diferencias psicopatológicas y de personalidad entre una muestra clínica, 52 pacientes con trastorno de pánico (TP) con agorafobia (TPA) o sin agorafobia y dos muestras no clínicas, una con 45 participantes con alta sensibilidad a la ansiedad (SA) y otra con 55 participantes con baja SA. La muestra clínica fue evaluada siguiendo criterios del DSM-IV-TR (APA, 2000). Los participantes fueron asignados a los grupos no clínicos en función de sus puntuaciones en el “Inventario de sensibilidad a la ansiedad” (ASI; Reiss, Peterson, Gursky y McNally, 1986). Los tres grupos fueron evaluados en psicopatología general utilizando el “Inventario breve de síntomas” (BSI; Derogatis y Melisaratos, 1983) y en personalidad con el “Inventario de personalidad NEO revisado (NEO-PI-R; Costa y McCrae, 1992). Los resultados muestran que únicamente existen diferencias estadísticamente significativas entre las personas con puntuación alta en SA y los pacientes con TP/TPA en las escalas psicopatológicas, ansiedad fóbica e ideación paranoide, así como en la faceta de personalidad ansiedad social.