

**Los adolescentes y conductas autodestructivas: un análisis exploratorio de los factores individuales y familiares** (pp. 271-288)

Diana Cruz<sup>1</sup>, Isabel Narciso<sup>1</sup>, Marina Muñoz<sup>2</sup>, Cícero Roberto Pereira<sup>1</sup> y Daniel Sampaio<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Universidade de Lisboa (Portugal); Universidad Autónoma de Madrid (España)*

Los estudios demuestran que el porcentaje de adolescentes estudiantes que relata pensamientos y conductas autodestructivas es de aproximadamente 20% en toda Europa. Mediante un análisis de regresión logística multinomial, el presente estudio investigó tres grupos de adolescentes ( $M= 15,88$ ;  $DT= 2,11$ ), uno sin informe de pensamientos/comportamientos autodestructivos (NSDTB;  $n= 998$ ), uno con informe de pensamientos/comportamientos autodestructivos (SDTB;  $n= 268$ ) y un grupo clínico (CS;  $n= 42$ ). Se evaluaron los estilos parentales, el apego de los padres, el funcionamiento familiar, la satisfacción con las relaciones familiares, autoestima y síntomas interiorizados y exteriorizados. Los hallazgos sugieren que la calidad del vínculo emocional con las madres, el control de los padres, la cohesión familiar y la disminución en la edad llevan a una menor probabilidad de pertenecer al grupo SDTB. Sin embargo, ser mujer, percibir un alto nivel de inhibición de exploración e individualidad de la madre, un alto nivel de rechazo de los padres y una baja satisfacción en las relaciones familiares, aumentan la probabilidad de pertenecer al grupo CS.