

**La escala de “Autoverbalizaciones durante la situación de hablar en público” (SSPS): propiedades psicométricas en una muestra española de fóbicos sociales (pp. 343-363)**

M<sup>a</sup> José Gallego<sup>1</sup>, Cristina Botella<sup>2,4</sup>, Azucena García-Palacios<sup>2,4</sup>, Soledad Quero<sup>2,4</sup>  
y Rosa M<sup>a</sup> Baños<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>*University of Amsterdam (Holanda);* <sup>2</sup>*Universitat Jaume I;* <sup>3</sup>*Universidad de Valencia;*  
<sup>4</sup>*Instituto de Salud Carlos III (España)*

El principal objetivo de este estudio es llevar a cabo la validación, en población clínica española, de la escala de “Autoverbalizaciones durante la situación de hablar en público” (*Self-Statements during Public Speaking*, SSPS; Hofmann y DiBartolo, 2000). Este instrumento está formado por 10 ítems con un formato de respuesta de seis puntos que miden las autoverbalizaciones asociadas a hablar en público. La escala fue administrada a 121 participantes con un diagnóstico de fobia social (*American Psychiatric Association*, 2000). El análisis factorial exploratorio indicó la existencia de dos factores: la subescala de Autoverbalizaciones positivas (SSPS-P) y la subescala de Autoverbalizaciones negativas (SSPS-N). La consistencia interna fue alta para ambas subescalas (SSPS-P  $\alpha = 0,81$ ; SSPS-N  $\alpha = 0,88$ ). Además el análisis de varianza reveló diferencias significativas en ambas subescalas del SSPS en función de los subtipos de fobia social. Los resultados apoyan la utilidad del SSPS en población clínica española (con diagnóstico de fobia social) para la evaluación de las autoverbalizaciones durante situaciones de hablar en público.