

**Trastornos de la conducta alimentaria y personalidad: un estudio comparativo**

(pp. 189-205)

Francisco Manuel Martín Murcia<sup>1</sup>, Adolfo J. Cangas Díaz<sup>2</sup>, Eugenia M<sup>a</sup> Pozo Pérez<sup>1</sup>,  
Margarita Martínez Sánchez<sup>1</sup> y Manuel López Pérez<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Instituto de Ciencias del Comportamiento;* <sup>2</sup>*Universidad de Almería;* <sup>3</sup>*Hospital  
Torrecárdenas, Almería (España)*

Los trastornos de personalidad asociados a trastornos del Eje I se han erigido como unos de los principales tópicos actuales en la investigación psicológica. Se diseñó un estudio descriptivo, comparativo y transversal cuyos objetivos fueron comparar las escalas de personalidad en una muestra clínica de 67 pacientes con TCA frente a un grupo control a través del MCMI-II y analizar la existencia de agregación de estilos de personalidad en función de la topografía del TCA. No se encontraron diferencias significativas en la agregación de estilos de personalidad entre grupos clínicos, aunque sí respecto al grupo control en la mayoría de las escalas patológicas. Se discute sobre las escalas en las que no se encontró diferencia entre ambos grupos (dependiente, histriónica, narcisista y compulsiva) y sobre la posibilidad de que ello se deba a la influencia de ciertos valores sociales imperantes y por tanto comunes a ambas muestras.