

**Presencia de trastornos de la conducta alimentaria en hombres y mujeres mexicanos:
algunos factores asociados (pp. 415-427)**

Rosalía Vázquez Arévalo, Xochitl López Aguilar, Georgina Leticia Álvarez Rayón, Karina Franco Paredes y Juan Manuel Mancilla Díaz
Universidad Nacional Autónoma de México - FES Iztacala (México)

El objetivo del presente estudio fue comparar entre hombres y mujeres la presencia de trastornos del comportamiento alimentario (TCA) y algunos factores asociados – Insatisfacción corporal y Factores cognitivos– en una muestra incidental de jóvenes mexicanos. Participaron 1483 jóvenes (731 mujeres y 752 hombres) con un promedio de edad de 16 años (DT= 4,29). Todos contestaron a cuatro cuestionarios que abordaban los siguientes aspectos: actitudes alimentarias (EAT-40), insatisfacción corporal (BSQ), aspectos conductuales y cognitivos (EDI) y comportamientos bulímicos (BULIT). Aquellos que rebasaron los puntos de corte del EAT y/o BULIT fueron entrevistados para diagnóstico de TCA. Los resultados indican que 12 participantes presentaron TCA; 3 mujeres Anorexia Nerviosa y 8 mujeres y un hombre. Bulimia Nerviosa. Además, hubo 48 casos con TCA No Especificado (TCANes, 41 mujeres y 7 hombres). En cuanto a los factores cognitivos, las mujeres presentaron mayor Motivación para adelgazar e Insatisfacción corporal y menor Identificación de la interocepción que los hombres, mientras que éstos tuvieron mayor Desconfianza interpersonal que las mujeres.