

**Prevalencia y correlación del inicio de los trastornos de ansiedad en la infancia entre blancos latinos y no latinos en los Estados Unidos (pp. 89-109)**

Liza M. Suarez<sup>1</sup>, Antonio J. Polo<sup>2</sup>, Chih-nan Chen<sup>3</sup> y Margarita Alegria<sup>4</sup>

<sup>1</sup>*University of Illinois at Chicago*; <sup>2</sup>*DePaul University*; <sup>3</sup>*Cambridge Health Alliance*;

<sup>4</sup>*Harvard Medical School and Cambridge Health Alliance (USA)*

Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más comunes (Kessler et al., 2005) y su comienzo a temprana edad pone a las personas en riesgo de una gran variedad de problemas posteriores (Weissman et al., 1999). Se utilizaron los datos del Estudio Nacional de Latinos y Asiáticos Americanos (National Latino and Asian American Study, NLAAS) y de la Replicación de la Encuesta Nacional de Comorbilidad (National Comorbidity Survey-Replication, NCS-R) para investigar la prevalencia y los factores asociados con el inicio de la ansiedad en la infancia entre los blancos nacidos en Estados Unidos, Latinos nacidos en Estados Unidos y Latinos nacidos en el extranjero. Se encontraron diferencias significativas en las tasas del trastorno por ansiedad con inicio en la infancia, con las tasas más bajas en los Latinos nacidos en el extranjero. En los tres grupos de etnia/lugar de nacimiento, los individuos con trastornos de ansiedad con inicio en la infancia mostraron niveles similares o más elevados de deterioro en el año anterior que los individuos con trastornos de ansiedad con inicio en la adultez. También se mostró el curso crónico asociado con los trastornos de ansiedad de comienzo en la infancia, pues estuvo presente sin importar la etnia o el lugar de nacimiento, indicado por las semejanzas a través de los grupos en el número promedio de trastornos a lo largo de la vida y las tasas de comorbilidad. Se discuten recomendaciones para la evaluación y el tratamiento con respecto a los hallazgos del estudio.