

**Comorbilidad psicopatológica en la adicción a la cocaína: resultados con el SCL-90-R**  
(pp. 275-288)

Javier Fernández-Montalvo<sup>1</sup>, Iñaki Lorea<sup>2</sup>, José J. López-Goñi<sup>2</sup> y Natalia Landa<sup>3</sup>  
*<sup>1</sup>Universidad Pública de Navarra; <sup>2</sup>Fundación Proyecto Hombre (Navarra); <sup>3</sup>Centro de Salud Mental de San Juan, Pamplona (España)*

En este artículo se lleva a cabo un análisis del perfil de consumo y de la comorbilidad psicopatológica en 60 pacientes cocainómanos que acuden en busca de tratamiento a un programa ambulatorio de Proyecto Hombre de Navarra. Para la evaluación de los pacientes se utilizan los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para la dependencia alcohólica, el EuropASI, para valorar la gravedad de la dependencia, y el SCL-90-R, como medida de la sintomatología asociada. Los resultados obtenidos muestran la presencia de numerosa sintomatología psicopatológica, con elevaciones significativas en la mayoría de las dimensiones del SCL-90-R, tanto en los hombres como en las mujeres de la muestra. La comparación con las muestras normativas refleja que los cocainómanos de la muestra presentan más síntomas psicopatológicos que la población normal, pero menos que la población psiquiátrica. Por último, se comentan las implicaciones de este estudio para la práctica clínica y para la investigación futura.