

Evaluación de factores psicosociales en un grupo de pacientes coronarios y un grupo de no coronarios (pp. 187-200)

Alberto Ferrer Botero, Eliana Andrea Montoya Herrera, Claudia Yaneth Osorio Tamayo,
Sandra Regina Posada Roldán y Domingo Iván Caraballo Gracia
Universidad de Antioquia (Colombia)

La presente investigación es descriptivo comparativa, de corte transversal e intentó verificar si existen diferencias, estadísticamente significativas, en el comportamiento de las variables psicosociales: estrés, apoyo social, ira, ansiedad y depresión entre un grupo de pacientes coronarios y un grupo de no coronarios. Se llevó a cabo con 35 enfermos coronarios y 37 personas sin diagnóstico de esta enfermedad, de ambos sexos, con edades entre 40 y 60 años. Se utilizaron las siguientes pruebas: Cuestionario de Sucesos Vitales (CSV), Cuestionario de Estrés Diario, (CED44A), Inventario Breve de Propensión a la Enfermedad (SIRI), Escala de Estrategias de Coping Revisada (EEC-R), Escala de Soporte Social Percibido (PSSS), Escala Estado-Rasgo y Expresión de la Ira (STAXI), Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) e Inventario de Depresión de Beck (IDB). No se encontraron diferencias significativas en las variables psicosociales entre los dos grupos. Esto podría explicarse por el hecho de que los pacientes coronarios participan en un programa de rehabilitación, que genera en ellos conciencia sobre su enfermedad y sobre las implicaciones para su vida familiar, de pareja, social y laboral.